

АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ТИББИ ВЕТЕРИНАРӢ

ДАСТУРИ МЕТОДӢ
ОИД БА ИСҚОТИ ҲАМЛИ САЛМОНЕЛЛӢЗИИ ГӢСФАНДОН
(*SALMONELLA ABORTUS OVIS*) ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН



Душанбе-2024

Дастури методӣ
оид ба «Исқоти ҳамли салмонеллэзии гӯсфандон (*Salmonella abortus ovis*) ва роҳҳои пешгирии он»

**Муаллифон: М. Амирбеков, Қ.А. Одинаев, С.Ҳ. Назруллозода,
Ҳ.И. Рачабов, Н.И. Раҳимов, Р.М. Шарипов**

*Дастури методии мазкур барои истифодаи роҳҳои самараноки
пешгирии бемории исқоти ҳамли салмонеллэзӣ ва бартараф кардани
зарари иқтисодӣ аз он дар хоҷагиҳои гӯсфандпарварии ҷумҳурий
тавсия дода мешавад.*

**Дастурамали методӣ аз ҷониби комиссияи методии Институти
тиббӣ ветеринарии АИКТ ба ҷоп тавсия дода шудааст.
Суратчаласи № «1» аз «29» январи с. 2024**

**Дастури методӣ дар Шӯрои олимони Институти тиббӣ
ветеринарии АИКТ дида ва маъқул доништа шуд (суратчаласи №
«1»), аз аз «30» январи с. 2024**

БАЧАПАРТОИИ САЛМОНЕЛЛЁЗИИ ГЌСФАНДОН


Искоти хамли (бачапартоии) салмонеллёзии гўсфандон – бемории музмини сирояткунанда мебошад, ки дар чорвои майдаи шохдор бачапартоӣ, илтиҳоби бачадон, бурсити буғумҳо ва наафтидани ҳамроҳак мушоҳида мешавад. Бемории салмонеллёз барои одамон низ хатарнок мебошад ва метавонад тавассути ғизои сироятнок дар одмаон захролудшавии хўрокиро пайдо намоянд (расмҳои 1, 2, 3).



Рас. 1. Итиқоли беморӣ



Рас. 2. Итиқоли беморӣ




Рас. 3. Итиқоли беморӣ

Барангезандаи беморӣ

Беморию бактерияҳо аз авлоди *Salmonella abortus ovis*, *Salmonella Typhimurium* ва ғ. ба вуҷуд меоранд.

Барангезандагони салмонеллёзҳо қаламчаҳои хурди рости нугҳояш гирд, грамманфии ҳаракатнок буда, буға ва ғилофа ҳосил намеkunанд (расми 4).



Расми 4: Бактерияҳои *Salmonella abortus ovis* дар зери микроскоп

Бактерияҳои салмонелла дар муҳитҳои ғизоии оддӣ агари гушту пептондор (МПА), пиёбаи гушту пептондор (МПБ), Хотингер, агари висмут - сульфатӣ, Эндо, Левина ва Плоскарев дар ҳарорати $+37^{\circ}\text{C}$ хуб месабзанд (расми 5).




Расми 5: Афзоиши бактерияҳои *Salmonella abortus ovis* дар ғизои Эндо

Дар маводи ғизоии агари гушту пептондор (МПА) афзоиши колонияҳо ва дар пиёбаи гушту пептондор (МПБ) тирашавии баробари ғизо мушоҳида карда мешавад (расмҳои 6 - 7).



Рас. 6. Афзоиши *S. ovis* дар ғизои МПА



Рас. 7. Афзоиши *S. ovis* дар ғизои МПБ

Аз рӯи устувориашон нисбат ба маводҳои дезинфенсионии кимиёвӣ салмонеллаҳо бо гурӯҳи микробҳои устувориашон суст мансуб мебошанд, вале ба таъсири омилҳои муҳити беруна устувор буда ба муддати тулонӣ боқӣ мемонанд.

Салмонеллаҳо дар хок, поруи ҳайвон 9-10 моҳ, оби нӯшокӣ 3-4 моҳ, чанги хона 12-18 моҳ, дар гӯшт 2,5-3 моҳ, дар творог ва равған 6 моҳ ҳифз меёбанд.

Дар ҳарорати 60°C салмонеллаҳо дар муддати 1 соат, дар ҳарорати 100°C дарҳол маҳв мегарданд. Дар ҳасади ҳайвонот то 100 рӯз, дар гӯшти яхкунонда шуда аз 6 то 13 моҳ, дар маҳсулоти ҳасибӣ то 9 моҳ, дар меваю сабзавоти яхкунонда аз 2 ҳафта то 2 моҳ зинда мемонанд. Намакхобондаҳо ва дуд додашудаҳои одӣ (соление ва копчении дар шароити хона тайёр шуда) салмонелларо маҳв намекунанд. Дар таъсири нурҳои мустақими офтоб салмонелла баъди 5-9 соат нобуд мегарданд.

Барои безаргардонии (дезинфексия) салмонеллаҳо маводҳои маҳлули гарми 2% гидроокиси натрий ва ё калий, маҳлули 2 % формалдегид, маводҳои хлордор, ки на кам аз 2 % хлори ғайол доранд истифода мешаванд.

Маводи дезинфексионии «Тамиз дуал» ва «Тамиз вет», ки аз ҷониби олимони Институти тибби ветеринарӣ лар ҳамкорӣ бо корхонаи Евродез тарҳрезӣ ва истеҳсол карда шудааст, нисбат ба бактерияҳои салмонелла самранокии баланд нишон медиҳанд ва истифодаи васеи онҳо дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода мешавад.

Маълумоти эпизоотӣ

Ба исқоти ҳамли салмонеллезии гӯсфандон ҳамаи чорвои майдаи шохдори синну соли гуногун ҳассоснокӣ доранд. Беморӣ дар шакли эпизоотӣ мушоҳида карда мешавад, ки дар натиҷа то 50 % гӯсфандони бугуз бача мепартоянд (расми 8-9). Талафот дар байни гӯсфандон 10-15 % ва дар байни барраҳо то 60%-ро ташкил медиҳад.



Расми 8. Ҳолатҳои бачапартоӣ



Расми 9. Ҳолатҳои бачапартоӣ

Беморӣ бо тариқи мавсимӣ дар давраи зимистону баҳор ба қайд гирифта мешавад ва дар марҳилаи дуҷуми ҳомиладорӣ бачапартоии бузӯ гӯсфандон мушоҳида мегардад (расми 10).



Расми 10. Ҳолатҳои бачапартоӣ

Манбаи барангезандаи бемории бузу гӯсфандони чорвои бемор ҳисобида мешаванд, ки бо пешоб, оби даҳон, ахлот салмонеллаҳоро паҳн меkunанд.

Омилҳои мусоидаткунандаи беморӣ ҳӯрокаи ғайриканоатбахш, сармозанӣ, гармии аз ҳад зёд, рондани тӯлонии чорво ба чарогоҳҳо, нарасидани макро ва микроэлементҳо ва витаминҳо ҳисобида мешаванд.

Нишонаҳои клиникии беморӣ

Искоти ҳамли салмонеллёзии чорвои хурди шохдор ба таври шадид, камшиддат, музмин ва ғайрихос мушоҳида карда мешавад.

Давраи ниҳоии беморӣ (инкубационный период) барои барраҳои навзод баробари 1-10, барои гӯсфандони калонсол 5-20 рӯзро ташкил медиҳад, ки аз чанд омилҳо вобастагӣ дорад.

Искоти ҳамли (бачапартоӣ) аксар вақт дар давраи дуҷоми ҳомиладорӣ мушоҳида мешавад (расми 11-12).



Рас. 11. Ҳолатиҷои бачапартоӣ



Рас. 12. Нишонаҳои ғайрифизиологии беморӣ

Дар як қисм гӯсфандон баландшавии ҳарорат (41-42°C), зиёдшавии нафаскашӣ ва дарунравӣ мушоҳида карда мешавад. Ахлот ба шакли моеъ мегардад ва рангаш сабз мешавад.

Дар баррачаҳо чараёни беморӣ бештар шадид мегузарад. Дар 1-5 рӯзи таваллуд беморӣ дида мешавад. Одатан дар рӯзҳои 2-3-юми беморӣ баландшавии ҳарорати бадан, хӯрок нахурдан, бемадорӣ, зиёдшавии набз, нафаскашӣ ва дарунравӣ ба қайд гирифта мешавад.

Дар мавриди нагузаронидани амалиётҳои табобат 80-90% барраҳои касал аз ин беморӣ мефавтанд. Дар як қисм барраҳои навтаваллудшуда дар рӯзҳои аввал дар милкҳои дандон хуншорӣ (гиперемия) мушоҳида мегардад.

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи хоси бемории салмонеллез ба барраҳо ҳолати кузапушт шудан (выгнутая дугой спина) ба шумор меравад.

Бештар дар гӯсфандон исқоти ҳамл дар моҳҳои 3-6 –уми ҳомиладорӣ ба амал меояд. Дар аксар бузу гӯсфандони бачапартофта наафтидани ҳамроҳак ва эндометрит мушоҳида карда мешавад.

Аломатҳои ташреҳию амрозии

Салмонеллез дар гӯсфандон бо тариқи септикотоксемия бо осеббинии узвҳои паренхиматозӣ ва узвҳои нафас мушоҳида мегардад. Барраҳои исқоти ҳамлшуда тез вайрон мешаванд. Дар қафаси сина ва шикам ҷамъшавии зардобаи серозию фибринозӣ дида мешавад. Гурдаҳо калон гашта, хуншорӣ ва шакли шуламонанд (кашицеобразная) буда, гилофаки пардаи гурда бо осони ҷудо мегардад, дар болои гурда рағғани сафеди зардмонанд рӯпӯш намоён мегардад.

Ҷигар ҳаҷман калон гашта, рангаш сурхи олучамонанди дағал мешавад. Дар пардаҳои ширдон ва рудаҳои борик илтиҳоби хуншорадор дида мешавад. Дил ҳаҷман калон гашта, дар пардаҳои луобӣ хуншорагӣҳо ба қайд гирифта мешаванд. Дар эндокард, эпикард ва пардаҳои луобӣ хуншорагӣҳо мушоҳида мегарданд (расми 13-14).



Расми 13. *Иллатҳои узвҳои паренхиматозӣ ҳангоми беморӣ*



Расми 14. *Иллатҳои узвҳои паренхиматозӣ ҳангоми беморӣ*


Испурч ва гирехҳои лимфавӣ ҳаҷмашон калон гашта, шаклаш мулоим мебошад. Дар бачадони гӯсфандони исқоти ҳамлшуда чамъшавии зардоби чиркӣ (экссудат) дида мешавад.

Ташҳис исқоти ҳамли салмонеллэзӣ

Ташҳиси исқоти ҳамли салмонеллэзии гӯсфандон дар асоси маълумотҳои эпизоотологӣ, нишонаҳои клиникӣ, тағйиротҳои патологоанатомӣ ва натиҷаҳои ташҳиси бактериологӣ ва серологӣ гузаронида мешаванд.

Ҳангоми гумонбар ба бемории салмонеллэз ба озмоишгоҳ ҳасади барраи исқоти ҳамл ва ё маводи амрозӣ: дил, ҷигар, шуш, испурч, гурда, рӯда бо риояи талаботҳои санитария бехдоштӣ на дертар аз 4 соати ҳолати исқоти ҳамл фиристода мешавад.

Дар озмоишгоҳ аз маводҳои амрозӣ молишак тайёр карда бо усули Грам ранг ва дар микроскоп муоина карда мешавад. Барангезандаи салмонеллэз қаламчаҳои ҳаракатноки хурди рости нугҳояш гирд, грамманфӣ буда, буға ва ғилоффа надоранд (расми 15) ва дар шароити аэробӣ ё анаэробии факултативӣ афзоиш меёбанд.



Рас. 15. Бактерияҳои Salmonella abortus ovis дар зери микроскоп

Барои ҷудо намудани хайли (штамм) тозаи барангезандаи салмонеллэз дар маводи ғизоии пиёбаи гушту пептондор (МПБ) ва ағари гушту пептондор (МПА) кишт гузаронида мешавад. Барангезандаи беморӣ дар асоси маълумотҳои културавӣ, биокимиёвӣ, биологӣ ва антигенӣ ҷудо карда мешавад.

Ташҳиси тафриқавӣ

Искоти ҳамли салмонеллэзии гӯсфандон (*Salmonella abortus ovis*) аз брутселлэз, хламидиоз, колибактериоз, листериоз, трихомоноз ва вибриоз дар асоси маълумотҳои эпизоотологӣ, клиникӣ, тафриқавӣ ва озмоишӣ фарқ карда мешавад.

Барои ташҳиси тафриқавӣ гузаронидани корҳои бактериологӣ ва серологӣ муҳим мебошанд.

Табобат

Барои табобати салмонеллэзҳо истифодаи антибиотикҳо ва сулфаниламидҳо ба монанди левомитсин, энтамитсин, биомитсин, тетрациклин (нитокс, окситет), дибиомитсин, фуразолидон тавсия дода мешавад.

Тибқи тадқиқоти гузаронидашуда барои табобати ин беморӣ дар баъзе ҳолатҳо истифодаи биомитсин ва ё тетрациклин бо комбинатсия стрептомитсин самаранок арзёбӣ мешавад.

Барои табобати бемории салмонеллэзи гӯсфандон истифодаи левомитсин ба даҳон ба миқдори 20-40 мг ба 1кг вазни зинда дар як рӯз ду маротиба тавсия дода мешавад. Истифодаи биомитсин ба дохили мушак ба миқдори 30,000-50,000 ВТ (ЕД) окситетрациклин ба миқдори 5-7 мг/кг вазни зинда самаранок арзёбӣ мегардад.

Барои пешгирӣ ва табобати салмонеллези гӯсфандон ва барраҳо истифодаи фуразолидон ба миқдори 0,3-0,5гр ба 1 сар чорво ба муҳлати 3 рӯз истифода мегардад.

Барои табобати салмонеллези гӯсфандон истифодаи бактериофаг ба дохили мушак барои гӯсфандон 30-40 мл, барои барраҳо 10-15 мл як маротиба тавсия дода мешавад.

Дар баъзе кишварҳо барои табобат ва пешгирии салмонеллези барраҳо зардоби бивалентии зидди бемории салмонеллез ва колибактериоз истифода бурда мешавад.

Институти тибби ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон барои табобат ва пешгирии исқоти ҳамли салмонеллези гӯсфандон маводи комплекси «Оксисулфален» ва «Оксилевофур»-ро ки аз ҷониби олимони Институт тарҳрезӣ шудаанд, тавсия медиҳад.

Маводи «Оксисулфален» ва «Оксилевофур» барои табобати салмонеллези барраҳо ба миқдори 30-50 мг ба 1 кг вазни зинда дар 1 рӯз ду маротиба ба муҳлати 3-5 рӯз тавсия дода мешавад.

Чорабиниҳои пешгирӣ

Барои пешгирии бемории исқоти ҳамли салмонеллези гӯсфандон вакцинаи поливалентии фармол-тимерсалӣ (поливалентная формал-тиамерсальная вакцина) истифода бурда мешавад. Вакцинаи мазкур дар хоҷагиҳои носолим нисбати ин беморӣ истифода мешавад. Барои пешгирии бемории исқоти ҳамли салмонеллези гӯсфандон вакцинаи пеш аз мондани кушқор дукарат ва реваксинатсия як маротиба пеш аз як моҳи наслгирӣ гузаронида мешавад.

Ҳоло барои пешгирии бемории исқоти ҳамли салмонеллезӣ истифода аз вакцинаи зидди бемории исқоти ҳамли салмонеллезӣ, ки аз ҷониби олимони Институти тибби ветеринарӣ аз хайлҳои маҳаллӣ тарҳрезӣ шудааст, тавсия дода мешавад. Вакцинаи мазкур нисбат ба беморӣ самаранокии баланди муҳифизатӣ нишон медиҳад.

Гузаронидани ваксинатсия ҳангоми камтар аз як моҳ пеш аз наслгирӣ ва 7 рӯзи баъди бордоркунӣ иҷозат дода намешавад.

Чораҳои мубориза

Ҳангоми муайян гардидани бемории исқоти ҳамли салмонеллези гӯсфандон дар хоҷагӣ ва ё маҳаллӣ аҳолинишин маҳдудият ворид карда мешавад.

Дар натиҷаи ворид кардани маҳдудият гузаронидани чорабиниҳои зерин **манъ аст**:

- кашонидан ё рондани чорвои майдаи шохдор аз як минтақа ба минтақаи дигар;

- ворид намудани чорво ба хоҷагии нисбати бемории мазкур номусоид;

- гурӯҳбандӣ ва ҷойивазкунии бузу гӯсфандон дар дохили хоҷагӣ;

- фуруши чорво берун аз хоҷагӣ ва содироти коҳ ва беда берун аз ҳудуди маҳаллӣ;

- чорвои исқоти ҳамлкарда аз рама ҷудо гардида, ё ба гӯшт супорида ва ё табобат карда мешавад;

- ҷасади бузу гӯсфандони ғавтида, ҳамроҳаки чорво дар хоҷагӣ сӯзонида мешавад;

- чорвои касал ва ё гумонбар ба беморӣ бо истифода аз антибиотикҳои комплексӣ ба монанди «Окисулфален», «Оксилевофур», «левомитситин», «энтамитсин», «биомитсин», «тетрасиклин», «дибиомитсин», «фуразолидон» табобат карда мешаванд;

- оғилхонаҳое, ки дар он ҷо исқоти ҳамл мушоҳида шудааст бо истифода аз 2% ишқори натрий, 5% маҳлули креолин, оҳаки хлордор бо ғавҷнокии хлори 2 %, маводи дезинфексионии «Тамиз дуал», «Тамиз вет» безарар карда мешаванд.

Пӯсти аз чорвои касал гирифташуда бо истифода аз маводи 3% эмулсияи криолин безарар карда мешавад.

Ахлоти чорвои касал бо усули биотермикӣ безарар гардонидида мешавад.

Дар хоҷагиҳои носолим бар зидди исқоти ҳамли салмонеллезии гӯсфандон бо вакцинаи истеҳсоли Институти тибби ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, ҳамасола тибқи дастурамали истифодаи вакцина эмгузаронӣ тавсия карда мешавад.

Дар хоҷагиҳои номусоид маҳдудият баъди 2 моҳи сиҳатёбии охири ҳолати бақайдгирии чорвои бемор бекор карда мешавад.

Муаллифон:

М. Амирбеков, Қ.А. Одинаев, С.Ҳ. Назруллозода, Ҳ.И. Раҷабов, Н.И. Раҳимов, Р.М. Шарипов. Институти тибби ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон.

Суроға: ш. Душанбе, кӯчаи Қаҳҳоров – 43.

